

適用雑草と使用方法 ラウンドアップ マックスロード

茎葉散布

適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
果樹類 (かんきつを除く)	-	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	200~500mℓ/10a	通常散布 50~100 ℓ /10a 少量散布 25~50 ℓ /10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	500~1000mℓ/10a	通常散布 50~100 ℓ /10a 少量散布 25~50 ℓ /10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		スギナ	収穫7日前まで (雑草生育期)	1500~2000mℓ/10a	通常散布 50~100 ℓ /10a 少量散布 25~50 ℓ /10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		マルバツユクサ	収穫7日前まで (雑草生育期)	500~1500mℓ/10a	通常散布 50~100 ℓ /10a 少量散布 25~50 ℓ /10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
かんきつ	-	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	200~1000mℓ/10a	通常散布 50~100 ℓ /10a 少量散布 5~50 ℓ /10a	5回以内	雑草茎葉散布	5回以内
		多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	500~1000mℓ/10a	通常散布 50~100 ℓ /10a 少量散布 5~50 ℓ /10a	5回以内	雑草茎葉散布	5回以内
		スギナ	収穫7日前まで (雑草生育期)	1500~2000mℓ/10a	通常散布 50~100 ℓ /10a 少量散布 25~50 ℓ /10a	5回以内	雑草茎葉散布	5回以内
		マルバツユクサ	収穫7日前まで (雑草生育期)	500~1500mℓ/10a	通常散布 50~100 ℓ /10a 少量散布 25~50 ℓ /10a	5回以内	雑草茎葉散布	5回以内
びわ(葉)	-	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200~500mℓ/10a	通常散布 50~100 ℓ /10a 少量散布 5~50 ℓ /10a	1回	雑草茎葉散布	3回以内
		一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	200~500mℓ/10a	通常散布 50~100 ℓ /10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内

> [ラウンドアップ マックスロード 適用雑草と使用方法](#)

> [ラウンドアップ マックスロード ALシリーズ 適用雑草と使用方法](#)

除草剤 ラウンドアップ マックスロード製品特長

除草剤 ラウンドアップ マックスロード ALシリーズ製品特長

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
					少量散布 25～50ℓ/10a			
		多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	500～1000mℓ/10a	通常散布 50～100ℓ/10a 少量散布 25～50ℓ/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		スギナ	収穫7日前まで (雑草生育期)	1500～2000mℓ/10a	通常散布 50～100ℓ/10a 少量散布 25～50ℓ/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		マルバツユクサ	収穫7日前まで (雑草生育期)	500～1500mℓ/10a	通常散布 50～100ℓ/10a 少量散布 25～50ℓ/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
オリーブ(葉)	－	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100ℓ/10a 少量散布 5～50ℓ/10a	1回	雑草茎葉散布	3回以内
		一年生雑草	収穫21日前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100ℓ/10a 少量散布 25～50ℓ/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		多年生雑草	収穫21日前まで (雑草生育期)	500～1000mℓ/10a	通常散布 50～100ℓ/10a 少量散布 25～50ℓ/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		スギナ	収穫21日前まで (雑草生育期)	1500mℓ/10a	通常散布 50～100ℓ/10a 少量散布 25～50ℓ/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		マルバツユクサ	収穫21日前まで (雑草生育期)	500～1500mℓ/10a	通常散布 50～100ℓ/10a 少量散布 25～50ℓ/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生及び 多年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)	200～1000mℓ/10a	少量散布 5～25ℓ/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100ℓ/10a 少量散布 25～50ℓ/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		多年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)	200～1000mℓ/10a	通常散布 50～100ℓ/10a 少量散布 25～50ℓ/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		スギナ	収穫前日まで (雑草生育期)	1500～2000mℓ/10a	通常散布 50～100ℓ/10a 少量散布 25～50ℓ/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100ℓ/10a 少量散布 5～50ℓ/10a	1回	雑草茎葉散布	1回
		多年生雑草	雑草生育期	500～1000mℓ/10a	通常散布 50～100ℓ/10a 少量散布 5～50ℓ/10a	1回	雑草茎葉散布	1回
水田作物 畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生雑草	雑草生育期	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100ℓ/10a 少量散布 5～50ℓ/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		多年生雑草	雑草生育期	500～1000mℓ/10a	通常散布 50～100ℓ/10a 少量散布 5～50ℓ/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
		スギナ	雑草生育期	1500～2000ml/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
水田作物 (水稲を除く) 移植水稲	－	一年生雑草及び 多年生広葉雑草	耕起前 (雑草生育期)	200～500ml/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 5～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
		多年生 イネ科雑草	耕起前 (雑草生育期)	500ml/10a	少量散布 5～25 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
		多年生 イネ科雑草	耕起前 (雑草生育期)	200～500ml/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
直播水稲	－	一年生雑草及び 多年生広葉雑草	耕起前 (雑草生育期)	200～500ml/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 5～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
		多年生 イネ科雑草	耕起前 (雑草生育期)	500ml/10a	少量散布 5～25 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
		多年生 イネ科雑草	耕起前 (雑草生育期)	200～500ml/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
		一年生及び 多年生雑草	耕起直後～出芽前 (雑草生育期) (乾田耕起栽培)	200～500ml/10a	少量散布 25～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
		一年生雑草	は種30日前～出芽前 (雑草生育期) (乾田不耕起栽培)	200～500ml/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 5～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
		多年生雑草	は種30日前～出芽前 (雑草生育期) (乾田不耕起栽培)	200～500ml/10a	少量散布 5～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
麦類	－	一年生雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期)	200～500ml/10a	少量散布 5～25 ℓ /10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		一年生雑草	は種後出芽前 (雑草生育期)	200～500ml/10a	少量散布 5～25 ℓ /10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		一年生雑草及び 多年生イネ科雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期)	200～500ml/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		一年生雑草及び 多年生イネ科雑草	は種後出芽前 (雑草生育期)	200～500ml/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
	圃場内の 周縁部	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)	200～500ml/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 5～50 ℓ /10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
雑穀類 (そば、 とうもろこしを 除く)	－	一年生雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期)	200～500ml/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
そば	－	一年生雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期)	200～500ml/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 5～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
		多年生雑草		200～500ml/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
					少量散布 25～50 ℓ /10a			
とうもろこし	－	一年生及び多年生雑草	とうもろこし出芽前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
豆類 (種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)	－	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
あずき いんげんまめ	－	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
		一年生雑草	収穫5日前まで (雑草生育期： 畦間処理)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
だいず	－	一年生雑草	耕起前又は出芽前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 5～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	4回以内
		一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	4回以内
		一年生雑草	落葉終期～ 収穫14日前まで (雑草生育期)	500mℓ/10a	50～100 ℓ /10a	1回	雑草茎葉散布	4回以内
えだまめ	－	一年生雑草	耕起前又は出芽前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 5～50 ℓ /10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	3回以内
野菜類 (えだまめ、はくさい、キャベツ、アスパラガス、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、だいこん、トマト、ピーマン、とうがらし類、きゅうり、なす、びわ(葉)、オリーブ(葉)、たらのぎ、薬用にんじん、いも類、豆類(種実)を除く)	－	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 5～50 ℓ /10a	1回	雑草茎葉散布	1回
はくさい キャベツ	－	一年生雑草	耕起前又は定植5日前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 5～50 ℓ /10a	1回	雑草茎葉散布	1回
レタス	－	一年生雑草	耕起前又は定植5日前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 5～50 ℓ /10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
ねぎ	-	一年生雑草	耕起前又は定植5日前まで(雑草生育期)	200~500ml/10a	通常散布 50~100ℓ/10a 少量散布 5~50ℓ/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		一年生雑草	収穫30日前まで(雑草生育期:定植後畦間処理)	200~500ml/10a	通常散布 50~100ℓ/10a 少量散布 25~50ℓ/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
たまねぎ(春播栽培)	-	一年生雑草	耕起5日前まで(雑草生育期)	200~500ml/10a	通常散布 50~100ℓ/10a 少量散布 5~50ℓ/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		一年生雑草	収穫7日前まで(雑草生育期:畦間処理)	200~500ml/10a	通常散布 50~100ℓ/10a 少量散布 25~50ℓ/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		スギナ	耕起又は定植14日前まで(スギナ生育期)	1500~2000ml/10a	通常散布 50~100ℓ/10a 少量散布 25~50ℓ/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
たまねぎ(秋播栽培)	-	一年生雑草	耕起5日前まで(雑草生育期)	200~500ml/10a	通常散布 50~100ℓ/10a 少量散布 5~50ℓ/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		一年生雑草	収穫7日前まで(雑草生育期:畦間処理)	200~500ml/10a	通常散布 50~100ℓ/10a 少量散布 25~50ℓ/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
にんにく	-	一年生雑草	耕起前まで(雑草生育期)	200~500ml/10a	通常散布 50~100ℓ/10a 少量散布 5~50ℓ/10a	1回	雑草茎葉散布	1回
		一年生雑草	収穫前日まで(雑草生育期:畦間処理)	200~500ml/10a	通常散布 50~100ℓ/10a 少量散布 25~50ℓ/10a	1回	雑草茎葉散布	1回
ほうれんそう	-	一年生雑草	耕起前又はは種前まで(雑草生育期)	200~500ml/10a	通常散布 50~100ℓ/10a 少量散布 5~50ℓ/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
にんじん	-	一年生雑草	耕起前又はは種前まで(雑草生育期)	200~500ml/10a	通常散布 50~100ℓ/10a 少量散布 5~50ℓ/10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
アスパラガス	-	一年生雑草	耕起前まで(雑草生育期)	200~500ml/10a	通常散布 50~100ℓ/10a 少量散布 5~50ℓ/10a	1回	雑草茎葉散布	3回以内
		一年生雑草	収穫前日まで(雑草生育期:畦間処理)	200~500ml/10a	通常散布 50~100ℓ/10a 少量散布 25~50ℓ/10a	2回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		スギナ	収穫前日まで(雑草生育期:畦間処理)	1500~2000ml/10a	通常散布 50~100ℓ/10a 少量散布 25~50ℓ/10a	2回以内	雑草茎葉散布	3回以内
だいこん	-	一年生雑草	耕起前又はは種前まで(雑草生育期)	200~500ml/10a	通常散布 50~100ℓ/10a 少量散布 5~50ℓ/10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
		一年生雑草	収穫5日前まで(雑草生育期:畦間処理)	200~500ml/10a	通常散布 50~100ℓ/10a 少量散布 25~50ℓ/10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
薬用ニンジン	－	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 5～50 ℓ /10a	1回	雑草茎葉散布	10回以内 (1年間に2回以内)
トマト しゃくやく(薬用) たらのき	－	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 5～50 ℓ /10a	1回	雑草茎葉散布	3回以内
きゅうり なす	－	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 5～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	3回以内
ピーマン とうがらし類	－	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 5～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
		一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
いも類 (かんしょを除く)	－	一年生雑草	耕起前又は 植付前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	1回	雑草茎葉散布	1回
かんしょ	－	一年生雑草	耕起前又は 挿苗前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
		一年生雑草	収穫60日前まで (雑草生育期： 畦間処理)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
茶	－	一年生及び 多年生雑草	摘採7日前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
さとうきび	－	一年生雑草	耕起前又は 植付前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	4回以内	雑草茎葉散布	6回以内
		多年生雑草	耕起前又は 植付前まで (雑草生育期)	500～1000mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	4回以内	雑草茎葉散布	6回以内
		一年生及び 多年生雑草	収穫60日前まで (雑草生育期： 畦間処理) (但し、仮茎長 1.5m 以上)	500～1000mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	6回以内
	圃場内の 周縁部	一年生雑草	収穫60日前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	6回以内
		多年生雑草	収穫60日前まで (雑草生育期)	500～1000mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	6回以内
飼料用 とうもろこし	－	一年生及び 多年生雑草	飼料用とうもろ こし出芽前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
					少量散布 5～50 ℓ /10a			
花き類・観葉植物(きくを除く)	－	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
きく	－	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
		一年生雑草	雑草生育期 畦間処理	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
樹木類	－	一年生雑草	雑草生育期	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 5～50 ℓ /10a	4回以内	雑草茎葉散布	4回以内
		多年生雑草	雑草生育期	500～1000mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 5～50 ℓ /10a	4回以内	雑草茎葉散布	4回以内
		スギナ	雑草生育期	1500～2000mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	4回以内	雑草茎葉散布	4回以内
		マルバツユクサ	雑草生育期	500～1500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	4回以内	雑草茎葉散布	4回以内
樹木等	公園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道 等	一年生雑草	雑草生育期	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	3回以内	植栽地を除く 樹木等の周辺地 に 雑草木茎葉散布	3回以内
		多年生雑草	雑草生育期	500～1000mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	3回以内	植栽地を除く 樹木等の周辺地 に 雑草木茎葉散布	3回以内
		一年生及び 多年生雑草	雑草生育期	500～1000mℓ/10a	少量散布 5～25 ℓ /10a	3回以内	植栽地を除く 樹木等の周辺地 に 雑草木茎葉散布	3回以内
		スギナ	雑草生育期	1500～2000mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	3回以内	植栽地を除く 樹木等の周辺地 に 雑草木茎葉散布	3回以内
		ススキ、ヒレハリソウ クズ 等のつる性 多年生雑草 ササ類 雑かん木	雑草生育期	1000～2000mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	3回以内	植栽地を除く 樹木等の周辺地 に 雑草木茎葉散布	3回以内
牧草	牧野、草地 (更新・造成)	一年生及び 多年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500mℓ/10a	少量散布 25～50 ℓ /10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		一年生及び 多年生雑草	耕起整地後～ は種当日まで (雑草発生揃期)	200～500mℓ/10a	少量散布 5～50 ℓ /10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		多年生 イネ科雑草	最終刈取後： 雑草生育期	500～1000mℓ/10a	50～100 ℓ /10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
ソルガム	－	一年生雑草	耕起前又は は種前まで	200～500mℓ/10a	通常散布 50～100 ℓ /10a 少量散布 25～50 ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
桑	-	一年生および多年生雑草	発芽前又は夏切後発芽前(雑草生育期)	200~500ml/10a	少量散布 25~50 ℓ /10a	4回以内	雑草茎葉散布	4回以内
林木	林地 造林地 (地ごしらえ)	ススキ、ササ類、クズ等の多年生雑草、雑かん木	生育期	1000~2000ml/10a	30 ℓ /10a	3回以内	雑草木茎葉散布	3回以内
まつ(下刈り)	-	ススキ、ササ類、クズ等の多年生雑草、雑かん木	生育期	1000~2000ml/10a	25 ℓ /10a	3回以内	雑草木茎葉散布	3回以内
飼料用 さとうきび	-	一年生雑草	耕起前又は植付前まで(雑草生育期)	200~500ml/10a	通常散布 50~100 ℓ /10a 少量散布 25~50 ℓ /10a	4回以内	雑草茎葉散布	4回以内
		多年生雑草	耕起前又は植付前まで(雑草生育期)	500~1000ml/10a	通常散布 50~100 ℓ /10a 少量散布 25~50 ℓ /10a	4回以内	雑草茎葉散布	4回以内

適用表PDFダウンロード

注入処理

表内検索

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数												
樹木等	公園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道 等	クズ	生育期	原液	1~2ml/株	-	株頭注入処理	-												
		雑かん木	雑かん木 生育期	原液又は 2倍液	1ml/ヶ所 幹周7~8cm間隔 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>地上30cm直径</td><td>ヶ所数</td></tr> <tr><td>10cm以下</td><td>2~3</td></tr> <tr><td>10~15cm</td><td>4~6</td></tr> <tr><td>16~20cm</td><td>7~9</td></tr> <tr><td>20cm以上</td><td>10以上</td></tr> </table>	地上30cm直径	ヶ所数	10cm以下	2~3	10~15cm	4~6	16~20cm	7~9	20cm以上	10以上	-	立木注入処理	-		
		地上30cm直径	ヶ所数																	
10cm以下	2~3																			
10~15cm	4~6																			
16~20cm	7~9																			
20cm以上	10以上																			
クズ・フジ等の つる類	生育期	原液又は 2倍液	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>つる径</td><td>使用量 (ml/株)</td></tr> <tr><td>2.0cm以下</td><td>0.5</td></tr> <tr><td>2.1~3.0cm</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>3.1~4.0cm</td><td>1.5</td></tr> <tr><td>4.1~5.0cm</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>5.1cm以上</td><td>3.0以上</td></tr> </table>	つる径	使用量 (ml/株)	2.0cm以下	0.5	2.1~3.0cm	1.0	3.1~4.0cm	1.5	4.1~5.0cm	2.0	5.1cm以上	3.0以上	-	つる注入処理	-		
つる径	使用量 (ml/株)																			
2.0cm以下	0.5																			
2.1~3.0cm	1.0																			
3.1~4.0cm	1.5																			
4.1~5.0cm	2.0																			
5.1cm以上	3.0以上																			
林木	林地	クズ・フジ等の つる類	生育期	原液又は 2倍液	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>つる径</td><td>使用量 (ml/株)</td></tr> <tr><td>2.0cm以下</td><td>0.5</td></tr> <tr><td>2.1~3.0cm</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>3.1~4.0cm</td><td>1.5</td></tr> <tr><td>4.1~5.0cm</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>5.1cm以上</td><td>3.0以上</td></tr> </table>	つる径	使用量 (ml/株)	2.0cm以下	0.5	2.1~3.0cm	1.0	3.1~4.0cm	1.5	4.1~5.0cm	2.0	5.1cm以上	3.0以上	-	つる注入処理	-
	つる径	使用量 (ml/株)																		
2.0cm以下	0.5																			
2.1~3.0cm	1.0																			
3.1~4.0cm	1.5																			
4.1~5.0cm	2.0																			
5.1cm以上	3.0以上																			
	林地	雑かん木、 間伐するすぎ、 ひのき	雑かん木、 間伐するすぎ、 ひのき 生育期	原液又は 2倍液	1ml/ヶ所 幹周7~8cm間隔 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>地上30cm直径</td><td>ヶ所数</td></tr> <tr><td>10cm以下</td><td>2~3</td></tr> <tr><td>10~15cm</td><td>4~6</td></tr> <tr><td>16~20cm</td><td>7~9</td></tr> </table>	地上30cm直径	ヶ所数	10cm以下	2~3	10~15cm	4~6	16~20cm	7~9	-	立木注入処理	-				
地上30cm直径	ヶ所数																			
10cm以下	2~3																			
10~15cm	4~6																			
16~20cm	7~9																			

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数		
					地上30cm直径 20cm以上	ヶ所数 10以上				
		アカギ	アカギ 生育期	原液	1mℓ/ヶ所 幹周7～8cm間隔	地上30cm直径 10cm以下 10～20cm 20cm以上	ヶ所数 2～3 4～8 10以上	－	立木注入処理	－
	林地 放置竹林 畑地	竹類	夏～秋期	原液	5～10mℓ/本			－	竹稈注入処理	－
畑作物	林地 放置竹林 畑地	竹類	夏～秋期	原液	5～10mℓ/本			－	竹稈注入処理	－
	畑地	アカギ	アカギ 生育期	原液	1mℓ/ヶ所 幹周7～8cm間隔	地上30cm直径 10cm以下 10～20cm 20cm以上	ヶ所数 2～3 4～8 10以上	－	立木注入処理	－

適用表PDFダウンロード

塗布処理

表内検索

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	
樹木等	公園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道 等	雑かん木	伐採直後	原液又は 2倍液	切り口全体に 十分量を塗布	－	植栽地を除く 樹木等 の周辺地に 切株塗布処理	－	
樹木類	林地 畑地	雑かん木	伐採直後	原液	切り口直径 5cm以下 5～10cm 10cm以上	塗布量 2mℓ 3～6mℓ 10mℓ以上	4回以内	切株塗布処理	4回以内
牧草	牧野 草地	雑かん木	伐採直後	原液	切り口直径 5cm以下 5～10cm 10cm以上	塗布量 2mℓ 3～6mℓ 10mℓ以上	2回以内	切株塗布処理	3回以内
日本芝 (のしば)	－	一年生及び 多年生雑草	雑草生育期	5倍～ 10倍	3～9ℓ/10a		3回以内	雑草茎葉塗布	3回以内

適用表PDFダウンロード

使用上の注意事項

- (1) 本剤はグリホサートを含む農薬であるので、他のグリホサートを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用すること。
- (2) 泥などで濁った水は効果を低下させるので本剤の調製には用いないこと。
- (3) 展着剤の加用の必要はない。
- (4) 本剤は土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はない。
- (5) 本剤は散布時の雑草の草丈や莖葉面積が大きい程、効果が確実となるので、散布前に雑草の地上部を刈り払わないこと。
- (6) 本剤は通常2～7日で効果が発現し、効果完成までさらに日数を要するので、誤って再散布しないこと。
- (7) スギナ防除に際しては、スギナが他雑草の中に埋没しているような条件の散布では効果が劣ることがあるので、スギナにかかるように注意して散布すること。
- (8) たまねぎ（春播栽培）のスギナに使用する場合、前作のたまねぎ（春播栽培）収穫後のスギナ生育期に散布すること。
- (9) 一年生広葉雑草、または多年生雑草のうちススキ、セイタカアワダチソウ等を主対象に使用する場合、所定範囲の多めの薬量を使用すること。
- (10) 生育の進んだマルバツユクサに使用する場合、所定範囲の多めの薬量を使用すること。
- (11) 処理後1時間以内の降雨は効果を低下させることがあるので、天候を良く見極めてから散布すること。
- (12) 注入処理の場合には
 - 1) 雑かん木、間伐するすぎ、ひのきには、樹幹の回りに等間隔にナタ目を入れ薬液を注入処理するか、ドリル等で穴を開けて薬液を注入処理し穴をコルク栓などで塞ぐこと。
 - 2) アカギには、根張り付近に等間隔にドリル等で穴を開けて薬液を注入処理し、穴をコルク栓などで塞ぐこと。
 - 3) 竹類の竹稈注入処理の場合は、処理竹から15m以内に発生したたけのこを食用に供さないこと。また、縄囲いや立て札により、たけのこが採取されないようにすること。
 - 4) クズ・フジ等つる類のつる注入処理に使用する場合、出来るだけ地際に近い部分に、外皮を木部が現れるように切り出しナイフ等で剥皮(幅1.0～1.5cm、長さ6～8cm程度)し、切り口に薬液が十分付着するように処理すること。また、つる径2cmを超えるものは浅めに切り口を1～2箇所つけて処理すること。
 - 5) クズの株頭注入処理に使用する場合、株頭にナタなどで傷をつけ、薬液がよくしみ込むように注入処理すること。
- (13) 少量散布の場合は、希釈水量(5～25 ℓ /10a又は25～50 ℓ /10a)に応じ、それぞれ専用のノズルを用いて、雑草木の葉面に均一に散布すること。
- (14) 農作物や有用植物に薬液が付着すると、激しい薬害が生じるので、かからないよう十分注意すること（だいたいの落葉終期～収穫14日前までに散布する場合を除く）。
- (15) 水田畦畔のアシカキ、ハイコヌカグサ、キシュウスズメノヒエ等に使用する場合、所定範囲の多めの薬量を使用すること。
- (16) 生育期畦間処理で使用する場合、飛散防止カバーを使用し、作物体にかからないように散布すること。
- (17) さとうきびの畦間処理で使用する場合、仮茎長が1.5m以上のさとうきびに使用し、さとうきびにかからないよう雑草莖葉に散布すること。また、倒伏したさとうきびに薬液が付着すると薬害が生じるので、かからないよう十分注意すること。
- (18) 牧草の適用雑草名「リードカナリーグラス」に使用する場合、雑草が生え揃った時期以降に散布し、草丈の目安は20cm以上とすること。
- (19) 作物の出芽前に使用する場合、出芽後に散布すると薬害を生じるおそれがあるので、必ず出芽前に散布すること。
- (20) 塗布処理の場合、
 - 1) 雑かん木には、伐採後、直ちに切り口全面に直接塗布すること。
 - 2) 芝の一年生及び多年生雑草には、雑草と芝の高低の差等を利用して、雑草の莖葉に塗布器具等で軽くなでるように塗布すること。誤って芝に付着すると薬害を生じるので十分に注意すること。
- (21) だいたいの落葉終期～収穫14日前までに使用する場合、特に以下のことに注意すること。
 - 1) 落葉終期とは、だいたいの葉の大部分が落葉した時期とする。
 - 2) だいたいの着生葉や莢色に淡緑色が残っている等の成熟の遅れた株(青立ち株)に散布すると、子実の変色やしわ粒等が発生する場合がありますので、散布前に除去等を行うこと。
 - 3) 水分含量の高い果実をつけた雑草では莖葉が枯れても果実が残る場合があり、汚損粒の原因となるので収穫前に除去等を行うこと。また、雑草の莖水分含量が高い場合も汚損粒の原因になるので収穫前に除去等を行うこと。
 - 4) 気温が低下する条件での処理であり、効果の完成まで2週間以上の期間を要するので、収穫時期は処理後3週間を目安とする。
- (22) 本剤の調製及び保管に際しては合成樹脂の内層のない鋼鉄製(ステンレスを除く)の容器類は使用しないこと。なお散布液を調製した容器及び散布器具は、使用后十分に水洗いすること。
- (23) 公園、堤とう等で使用する場合、特に以下のことに注意すること。
 - 1) 水源池、養殖池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意すること。
 - 2) 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理すること。
- (24) 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (25) 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめ使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

関連コンテンツ



ラウンドアップ マックスロード

広い面積の場合は、水で薄めて使うお得な希釈タイプの除草剤 ラウンドアップマックスロードが断然お得！



ラウンドアップ マックスロードAL シリーズ

手軽に使いたい場合は、そのまま使えるシャワータイプの除草剤 ラウンドアップマックスロードALシリーズが便利！

[> サイトマップ](#) [> お問い合わせ](#) [> プライバシーポリシー](#) [> サイトご利用について](#) [> 会社情報](#)

Copyrights © 2018 NISSAN CHEMICAL CORPORATION All Rights Reserved.